

Dezinfekční řád při výskytu hepatitidy typu A a jiných nákaz způsobených odolnými viry včetně noro viru

Oblast použití	Jak	Produkt	Účinná látka	Ředění	Expozice	Poznámka
MYTÍ RUKOU	před začátkem činnosti, po skončení práce a po použití WC, před jídlem, při přípravě jídla a jeho vydáním	nanést mýdlo na ruce, zpěnit a vtírat 30 vteřin	MANISOFT		neředit	30 vteřin
DEZINFEKCE RUKOU		nanést na suché ruce, po celou dobu dezinfekce musí být ruce vlhké	SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	neředit	3 ml vtírat do suchých rukou 2min
REGENERACE POKOŽKY	nanést malé množství krému a vetřít do suché pokožky	SILONDA		neředit		
PŘEDMĚTY, POMŮCKY, NÁSTROJE	nástroje, pomůcky, včetně silikonu, pryže, plastů	ihned po použití zcela ponořit do připraveného dezinfekčního roztoku, po expozici důkladně opláchnout pitnou vodou, osušit	SEKUSEPT AKTIV	aktivní kyslík	1% 2%	30 min 10 min
	nekovové předměty, podložní mísy		MEDICARINE	chlór	1tbl/5l vody 1 tbl/1,5 L	15 min* 15 min
NÁDOBÍ	dekontaminace před mytím	nečistoty odstranit důkladně stěrkou, po uplynutí doby expozice umýt v myčce nebo ručně, znečištěný roztok vyměnit	MEDICARINE	chlór	1tbl/1,5 L	15 min
	dezinfekce po mytí	omyté vložit do roztoku, po uplynutí expozice důkladně opláchnout pitnou vodou	MEDICARINE		2-3 tbl/10 L	15 min
PLOCHY A POVRCHY	podlahy, stolky, velké plochy apod.	3 x denně nebo dle potřeby otřít povrchy a nechat zaschnout	INCIDIN RAPID	aldehyd, KAS	0, 5%	60 min
			MEDICARINE	chlór	3-4 tbl /10 L	15 min*
	WC, výlevky, umyvadla, sprchy	1 až 2 denně	MEDICARINE	chlór	4 tbl /10 L	15 min*
MALÉ PLOCHY A POVRCHY VČETNĚ PLOCH Z CITLIVÝCH MATERIÁLŮ	malé plochy vše	postříkat pěnou a rozetřít	INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	konc.	2min*/ 30 min
	klávesnice počítačů, telefony a malé plochy vše	otřít dezinfekčním ubrouskem	INCIDIN OXY WIPE S	peroxid vodíku	ubrousky	30 min*
		otřít připraveným roztokem	SANI CLOTH ACTIVE	KAS	ubrousky	30 min
	citlivé materiály	otřít připraveným roztokem	SEKUSEPT AKTIV	aktivní kyslík	1% 2%	30 min 10 min
	systém utěrek Incidin wipes	otřít vlhčenou utěrkou z 3 l zásobníku	INCIDIN RAPID	aldehyd, KAS	1%	15 min
LIKVIDACE BIOLOGICKÉ ZÁTĚŽE	krev, tělní tekutiny	roztok nalít na textilii, přikrýt znečištění po dobu expozice, odstranit do infekčního odpadu	MEDICARINE	chlór	1 tbl/1,5 L	15 min
DEZINFEKCE SIFONŮ		odpad zalít roztokem	MEDICARINE	chlór	1 tbl/1,5 L	30 min nebo přes noc

*nižší biologická zátěž

Před střídáním dezinfekčních přípravků na podlahy a povrchy je nutné provést umytí povrchu teplou vodou s neutrálním mycím prostředkem

Dezinfekční prostředky ředte jen studenou vodou!!!

Ředění koncentrátu			
0,5%	do 1 litru = 5 ml	1%	do 1 litru = 10 ml
	do 5 litrů = 25 ml		do 5 litrů = 50 ml
	do 8 litrů = 40 ml		do 8 litrů = 80 ml
	do 10 litrů = 50 ml		do 10 litrů = 100 ml
2%	do 1 litru = 20 ml		do 5 litrů = 100 ml
			do 8 litrů = 140 ml
			do 10 litrů = 200 ml

Incidin rapid - 1 x otočení dávkovací lahve = 20 ml